

**ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು**  
**ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ವಿಭಾಗ, ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-65**  
**ನಾಯನಹಳ್ಳಿಯ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಝಚನೆ**

ದಿನಾಂಕ: 23.10.2020

**ಈ ವಾರದ ಮುನ್ಝಚನೆ (23.10.20 ರಿಂದ 27.10.20 ರ ವರೆಗೆ)**

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	23-10-20	24-10-20	25-10-20	26-10-20	27-10-20
ಮಳೆ (ಮಿ. ಮಿ.)	20.5	6.8	6.7	9.1	26
ಗರಿಷ್ಟ ಉಪಾಂಶ(ಡಿ.ಸೇ.)	25.7	26	24	26.2	25.9
ಕನಿಷ್ಟ ಉಪಾಂಶ (ಡಿ.ಸೇ.)	19.1	19.1	19.4	19.2	18.2
ಮೋಡ (ಪ್ರಮಾಣ)	8	8	8		6
ಅಧ್ಯತ್ಮ 7.20 ಬೆ (ಶೇ)	92	95	89	85	83
ಅಧ್ಯತ್ಮ 2.20 ಮ (ಶೇ)	69	63	73	61	63
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕ.ಮಿ/ಗಂಟೆಗೆ)	10	11	6	6	8
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	288	248	285	23	19

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುನ್ಝಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮುಂದಿನ ಇದು ದಿನಗಳು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ, ದಿನದ ಗರಿಷ್ಟ ಉಪಾಂಶವು  $24\text{--}26^{\circ}\text{C}$  ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಟ  $18\text{--}19^{\circ}\text{C}$  ಇರಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗಿನ ಅಧ್ಯತ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ  $83\text{--}95\%$  ಇದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ  $61\text{--}73\%$  ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಾಸರಿ  $6\text{--}11$  ಕ.ಮಿ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೇಸುವ ಸಂಭವವಿದೆ.

ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ಕಾಲವು ಅಕ್ಷೋಬರ್ ತಿಂಗಳ 24 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 5 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಷ್ಟತ್ವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ವಲಯದ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯು 47.9 ಮಿ. ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

### **ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರ**

- ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕೆಯಾದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೇಂದ್ರ್ಯಾಚೈಪ್ರಯಾರ್ಯಕದಿಮೆಂಪಧಿ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಹೀವಿನ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ, ಅವರೆ, ರಾಗಿ, ಅಲಸಂದೆ ಹಾಗೂ ಕರು ಧಾನ್ಯಗಳಾದ ನವಕೆ, ಸಜ್ಜಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವದಿ ಬೆಳೆಗಳು (ತೊಗರಿ ಮತ್ತು ಹರಳು) ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು.
- ಹೆಚ್ಚೆಜೋಳ: ತೇವಾಂಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಕಳೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕ್ಕೆಂತಹ ಕಳೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಮಳೆ ಬಂದತಕ್ಕಣ 25 ಕ. ಗ್ರಾ. ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚೆಗೆ ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಉಪಚರಿಸಿ.

- ಅಲಸಂದೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ-152 ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಮ್-5, ಟಿ.ವಿ.ಎಕ್ಸ್-944. ಅಥವಾತರಕಾರಿಗಾಗಿ ಪಿ.ಕೆ.ಬಿ-4 ತಳಿಯನ್ನು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಅವರೆ: ಎಚ್.ಎ-3 ಮತ್ತು 4 ತಳಿಯನ್ನು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮುನ್ನಜ್ಯೆಪಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾದ ರೈಚೋಬಿ0ಯಮ್ ನಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು.

#### **ಜಾನುವಾರು:**

- ಜಾನುವಾರು, ರೇಷ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಕೋಳಿ ಸಾಕನೆ ಕೊಡಿಯಿ ಉಷ್ಣಂಶದ ಶಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು.
- ಜಂತು ಮುಳಗಳ ನಿವರಣೆಗಾಗಿ ಪಶುವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಂತು ನಿವಾರಕ ಚಿಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕರು ಮಟ್ಟಿದ 7ನೇಯ ದಿನ, 1 ನೇಯ ತಿಂಗಳು , 6 ನೇಯ ತಿಂಗಳು ತಪ್ಪದೆ ಹಾಕಬೇಕು.

#### **ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ:**

- ಬ್ರಿಫ್ಸ್/ಹೇನು/ಎಫಿಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆರಡ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆಅಕ್ಕೆ (1ಗ್ರಾಂ/ಲೀ) ಅಥವಾಇಮಿಡಾಕ್ಸ್‌ಪ್ರಿಡ್ (2.0 ಮಿ.ಲೀ/ಲೀ) ಅಥವಾ ಶೇ. 4 ರಷ್ಟು ಬೇವಿನ ಕಷಾಯ/ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಗುಲಾಬಿ: ಕಬ್ಬಿಣದಕೊರತೆಯಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲು ಬಯೋ-20 ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನ ಲಘು ಹೊಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಗುಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಹಾಗೂ ವೆಗ್ಗು ತಿನ್ನುವ ಕೆಟಿ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ 2 ಎಂ.ಎಲ್ ವೆಲಾಧಿಯಾನ್ (500 ಮೀ. ಲೀ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ) ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಕವ್ವು ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ, 1 ಎಂ.ಎಲ್ ಪ್ರೋಪಿಕೊನೊಜೆಲ್ (200 ಮೀ. ಲೀ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ) ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗಕಂಡುಬಂದರೆ, ಕಾಬಣಂಡ್ಯಜೀಮ್‌ಆನ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕ ರೋಗ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಕಾಬಣಕ್ಸ್‌ನ್ (0.5 ಮೀ. ಲೀ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್) ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ವೆಕ್ಕೆಜೋಳಿ: ಕಾಂಡಕೊರಕದ ಮುಳಿವಿನ ಹತೋಟಿಗೆ ಕ್ಕೊಲ್ರೋಫಾಸ್-25 ಇ.ಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು2 ಮೀ. ಲೀ/ಪ್ರತಿ ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲೇರೋಪ್ರೇರಿಫಾಸ್-20 ಇ.ಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು2 ಮೀ. ಲೀ/ಪ್ರತಿ ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ತೊಗರಿ: ಸೊರಗುರೋಗಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬುಡ ಸಹಿತ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಬಣಂಡ್ಯಜೀರಿಫ್‌ಮ್ 2 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿ ಕೊರಕಕೀಟದ ಬಾಧೆಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಇಂಡಾಸ್ಟ್ರಿಕಾಬೊಡ್ 1 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಹೂ ಕೋಸು ಹಾಗೂ ಎಲೆ ಕೋಸುನಲ್ಲಿ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಮುಳು (ಡ್ಯೂಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ) ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಕಷಾಯ/ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

#### **ನೋಡಲ್ಾ ಅಧಿಕಾರಿ**

ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ವಿಭಾಗ

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,

ಬೆಂಗಳೂರು